

蜂王蛹蛋白及其酵素水解物之抗氧化性

王智群、張基郁

E-mail: 324890@mail.dyu.edu.tw

摘要

蜂王蛹(bee pupae)為蜂蟲的幼蟲，富含胺基酸、礦物質及維他命，為珍貴之動物性蛋白。本研究目的為探討蜂王蛹蛋白及其酵素水解物之抗氧化性，以90°C加熱30分鐘之蜂王蛹為材料，利用磷酸緩衝溶液萃取，並以硫酸銨沉澱劃分蜂王蛹蛋白。結果顯示，經加熱之蜂王蛹磷酸緩衝溶液萃取物，其亞鐵離子螯合能力高於未加熱者，經硫酸銨沉澱後，加熱組之硫酸銨飽和度40~70%劃分蛋白質亞鐵離子螯合能力最高。以Alcalase及Flavourzyme分別對蜂王蛹蛋白進行酵素水解24與36小時，亞鐵離子螯合能力分別為14.55及14.29%；DPPH自由基清除活性分別為27.22及29.99%。利用Flavourzyme水解蜂王蛹蛋白，從1小時至第36小時，水解率分別為27.15及81.45%；利用Alcalase水解蜂王蛹蛋白，從1小時至第24小時，水解率均為7.09%。以上結果顯示蜂王蛹蛋白經硫酸銨沉澱及酵素水解後，抗氧化性皆顯著降低。

關鍵詞：抗氧化、硫酸銨、蛋白質、Alcalase、Flavourzyme

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要iii 英文摘要iv 誌謝v 目錄vii 圖目錄x 表目錄xii 縮寫字表xiii 1. 緒論1 2. 文獻回顧3 2.1 蜂蛹之簡介3 2.1.1 蜂蛹的定義3 2.1.2 蜂蛹的成分3 2.1.3 蜂王蛹的研究及應用9 2.2 蛋白質水解7 2.2.1 蛋白質水解酵素7 2.2.2 酵素水解之影響因子8 2.2.3 蛋白質水解特性及應用9 2.3 蛋白質水解物之介紹10 2.3.1 蛋白質水解物之應用10 2.3.2 抗氧化性11 2.4 氧化作用11 2.4.1 自由基11 2.4.2 自由基的來源與種類12 2.4.3 抗氧化防禦系統15 3. 材料與方法17 3.1 實驗材料17 3.1.1 原料17 3.1.2 藥品17 3.1.3 儀器設備19 3.1.4 蛋白質分解酵素20 3.2 實驗方法與分析項目21 3.2.1 實驗流程21 3.2.2 基本組成分析22 3.2.3 蛋白質分析24 3.2.4 抗氧化性分析30 3.3 統計分析33 4. 結果與討論34 4.1 蜂王蛹之基本成分34 4.2 蛋白質分析34 4.2.1 蜂王蛹經不同處理後其磷酸緩衝溶液萃取物之抗氧化性34 4.2.2 不同硫酸銨飽和度沉澱之回收率及抗氧化性44 4.2.3 蜂王蛹蛋白之電泳分析46 4.3 蜂王蛹蛋白之酵素水解46 4.3.1 以Alcalase和Flavourzyme水解蜂王蛹蛋白之水解率46 4.3.2 蜂王蛹蛋白之Alcalase和Flavourzyme水解物之抗氧化性51 5. 結論57 參考文獻59 圖目錄 圖3.1 本研究之實驗流程圖21 圖4.1 加熱與未加熱處理之蜂王蛹磷酸緩衝溶液萃取物之還原力37 圖4.2 加熱與未加熱處理之蜂王蛹磷酸緩衝溶液萃取物之亞鐵離子螯合能力39 圖4.3 加熱與未加熱處理之蜂王蛹磷酸緩衝溶液萃取物之DPPH自由基清除活性41 圖4.4 Trolox之標準曲線42 圖4.5 加熱與未加熱處理之蜂王蛹磷酸緩衝溶液萃取物之Trolox當量抗氧化力43 圖4.6 蜂王蛹蛋白質經不同飽和度硫酸銨沉澱之回收率及亞鐵離子螯合能力45 圖4.7 以40~70%硫酸銨飽和度劃分所得蜂王蛹蛋白質SDS-PAGE電泳圖47 圖4.8 經飽和度40~70%硫酸銨沉澱之蜂王蛹蛋白劃分物以Alcalase(24小時)和Flavourzyme(36小時)水解之水解率(DH)49 圖4.9 經飽和度40~70%硫酸銨沉澱之蜂王蛹蛋白劃分物以Alcalase(24小時)水解之水解物亞鐵離子螯合能力53 圖4.10 經飽和度40~70%硫酸銨沉澱之蜂王蛹蛋白劃分物以Alcalase(24小時)水解之水解物DPPH自由基清除活性54 圖4.11 經飽和度40~70%硫酸銨沉澱之蜂王蛹蛋白劃分物以Flavourzyme(36小時)水解之水解物亞鐵離子螯合能力55 圖4.12 經飽和度40~70%硫酸銨沉澱之蜂王蛹蛋白劃分物以Flavourzyme(36小時)水解之水解物DPPH自由基清除活性56 表目錄 表2.1 蜂蛹所含的營養素4 表2.2 蜂蛹粉所含胺基酸5 表3.1 硫酸銨飽和濃度表26 表3.2 分離膠組成29 表3.3 堆積膠組成29 表4.1 蜂王蛹之一般組成35

參考文獻

1. 山口庚兒。1998。蜂子粉末的營養療效。第33-60頁。世貿出版社。台北。
2. 王正仁、陳孟伶、林畢修平、陳啟祥。1999。水解酵素在工業上的利用。生物產業10: 1-11。
3. 王念慈。2004。新鮮與老化葉菜類蔬菜之總抗氧化力之測定與變異:1-2。台灣大學園藝學研究所碩士論文。台北。
4. 王鐸葦。2008。牛初乳乳清解物對LDL及細胞DNA氧化性傷害之抑制研究。大葉大學生物產業科技學系碩士論文。彰化。
5. 安奎、何鎧光、陳裕文編著。2004。養蜂學。第363-364頁。華香園出版社。台北，臺灣。
6. 吳登楨。2002。台灣蜂業研究之回顧與展望。科學農業，50 (3,4):189-193。
7. 李錦楓。2002。蜂產品的保健功能(五)蜜蜂子(蜂蛹)。健康世界 199 (319):56-58。
8. 李綾晏。2009。蜂王蛹蛋白及其酵素水解物對血管收縮素轉換酵素之抑制活性研究。私立大葉大學生物產業科技研究所碩士論文。彰化。
9. 李佳珍，張文昌，吳思敬。2009。複方保健茶之抗致突變性及抗氧化性。台灣農業化學與食品科學。47 (6):277-284。
10. 林建豪。2008。牛初乳對LDL及細胞DNA氧化性傷害之抑制研究。大葉大學生物產業科系學系碩士論文。彰化。
11. 林天送。1995。氧自由基:促使細胞的老化與死亡。健康世界。111: 9-14。
12. 林天送。1995。?基自由基:毒性極高的破壞分子。健康世界。112: 6-10。
13. 林致欣。1999。鯖魚肉與內臟水解物之抗氧化性研究。國立台灣海洋大學食品科學系碩士論文，基隆。
14. 郭智宏。2001。腸道吸收-胺基酸與勝?。食品工業。33: 15-25。
15. 陳麗婷、程竹青、華傑編著。2004。食品勝?技術發展路程圖(Roadmap)。第63頁。食品工業發展

研究所。新竹，台灣。16.陳志璋。2007。微膠囊化牛初乳蛋白質水解物之抗氧化安定性。私立大葉大學生物產業科技研究所碩士論文。

彰化。17.塗佳琪。2006。蜂王蛹蛋白及其酵素水解物對血管收縮素轉換酵素之抑制活性研究。私立大葉大學生物產業科技研究所碩士論文。彰化。18.許惠惇。2000。黃豆蛋白質酵素水解物中生理活性胜?之篩檢研究。國立陽明大學生物化學研究所碩士論文，台北。

19.廖恬瑤。2009。蜂王蛹蛋白及水解物對細胞DNA氧化性傷害及LDL氧化之抑制研究。私立大葉大學生物產業科技研究所碩士論文。彰化。20.劉毓蕙。2004。水解蛋白的特性及運用。食品工業。36: 19-24。21.鄭宇哲，莊榮輝，廖大修。2003。蛋白質體學。教育部顧問室生物技術科技教育改進計畫醫藥基因生物技術教學資源中心。台北，台灣。22.鄭名凡。1999。蛋白質水解物的功能與應用。食品資訊。160: 49-54。23.鄭靜桂。1997。蛋白質水解與水解液之利用。食品工業，29(5): 10-17。24.Adler-Nissen, J. 1986. Some fundamental aspects of food protein hydrolysis. In "Enzymatic Hydrolysis of Food Protein". pp. 20-21. Elsevier Science Publishing Co., Inc. New York, USA.

25.Afans, E. B., Dcrozhko, A. I., and Brodskii, A. 1989. Chelating and free radical scavenging mechanisms of inhibitory action of ruin and quercetin in lipid peroxidation. Biochem. Pharmacol. 38(11): 1763 – 1989. 26.Agarwal, S. and Sohal, R. S. 1994. DNA oxidative damage and life expectancy in houseflies. P. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 91: 12332-12335. 27.Ames, B. N., Shigenaga, M. K., and Hagen, T. M. 1993. Oxidants, antioxidants, and the degenerative diseases of aging. P. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 90: 7915-7922. 28.Arnao, B. M., Cano, A., Hernandez-Ruiz, J., Garcia-Canovas, F., and Acosta, M. 1996. 2, 2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) oxidation catalyzed by peroxidase: a new approach for determining total antioxidant status of food. Ana. Biol. Chem. 236: 255-261. 29.Ames, B. N. 1983. Dietary carcinogens and anticarcinogens: oxygen radicals and degenerative diseases. Sci. 211: 1256-1264. 30.Anderson, D. and Phillips, B. J. 1999. Comparative in vitro and in vivo effects of antioxidants. Food Chem. Toxicol. 37: 1015-1025. 31.Ariyoshi Y. 1993. Angiotensin-converting enzyme inhibitors derived from food proteins. Trends Food Sci. Technol. 4: 139-144. 32.AOAC. 1995. Offical method of Analysis, 14th ed. Association of Offical American Chemists, Washington, D.C., U.S.A. 33.Blois, M.S. 1958. Antioxidant determinations by the use of a stable free radical, Nature. 181: 1199-1200. 34.Chang, C. Y., Wu, K. C. and Chiang, S. H. 2007. Antioxidant properties and protein compositions of porcine haemoglobin Hydrolysates. Food Chem. 100: 1537-1543. 35.Chen, H. M., Muramoto, K. and Yamauchi, F. 1995. Structural analysis of antioxidative peptides from soybean -conglycinin. J. Agric. Food Chem. 43(3): 574-578. 36.Chen, H. M., Muramoto, K., Yamauchi, F. and Nokihara, K. 1996. Antioxidant activity of designed peptides based on the antioxidative peptide isolated from digests of a soybean protein. J. Agric. Food Chem. 44(9): 2619-2622. 37.Clement, A. 2000. Enzymatic protein hydrolysates in human nutriation. Trends Food Sci. Technol. 11: 254-262. 38.Clement, A. and Chambers, S. J. 2000. Development and production of hypoallergenic protein hydrolysates for use in infant formulas. Food Allergy Int. 1: 175-190. 39.Conner, E. M. and Grisham, M. B. 1996. Inflammation, free radicals, and antioxidants. Nutrition 12: 274-277. 40.Decker, E. A. and Welch, B. 1990. Role of ferritin as a lipid oxidants. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 94: 1971- 1978. 41.Decker, E. A. and Welch, B. 1990. Role of ferritin as a lipid oxidants. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 94: 1971- 1978. 42.Dorman, H. J. D., Peltoketo, A., Hiltunen, R., and Tikkanen, M. J. 2003. Characterization of the antioxidant properties of deodorised aqueous extracts from selected Lamiaceae Herbs. Food Chem. 83(2): 255 – 262. 43.Fagbenro, O. and Tauncery, K. 1993. Chemical and nutriational quality of raw, cooked and salted fish silage. Food Chem. 48: 331-335. 44.Freitas O. D., Padovan, G. J., Vilela, L., Santos, J. E. D., Oliveria, J. E. and Green, L. J. 1993. Characterization of protein hydrolysate prepared for enteral nutrition. J. Agric. Food Chem. 41: 1432?-1438. 45.Gildberg, A. 1993. Enzymatic processing of marine raw materials. Process Biochem. 28: 1-15. 46.Gordon, M. H. 1990. The mechanism of the antioxidant action in vitro. Food Antioxidants. New York: Elsevier. pp. 1 – 18. 47.Halliwell, B. and Gutteridge, J. M. C. 1990. Role of free radicals and catalytic metal ions in human disease: An overview. Methods in Enzymology. 48.Harman, D. 1995. Role of antioxidant nutrients in aging: overview. Age 18: 51-62. 49.Kagawa, K., Matsutaka, H., Fukuhama, C., Watanabe, Y. and Fujino, H. 1996. Globin digest, acidic protease hydrolysate, inhibits dietary hypertriglyceridemia and Val-Val-Tyr-Pro, one of its constituents, possesses most superior effect. Life Sci. 58(20): 1745-1755. 50.Kim, H. H. Y., and Jimenez-Flores. R. 1994. Comparison of milk proteins using preparative isoelectric focusing followed by polyacrylamide gel electrophoresis. J Dairy. Sci. 77: 2177-2129. 51.Koner, B. C., Banerjee, B. D. and Ray, A. 1997. Effects of in-vivo generation of oxygen free radicals on immune responsiveness in rabbits. Immunol. Lett. 59: 127-137. 52.Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature. 277: 680-685. 53.Lahl, W. J. and Braun, S. T. 1994. Enzymatic production of protein hydrolysates for food use. Food Technol. 48(10): 68-71. 54.Liu, C. C., Huang, L. C., Chang, C. T., Sung, H. Y. 2006. Purification and characterization of soluble invertases from suspension-cultured bamboo (*Bambusa edulis*) cells. Food Chem. 96: 621-631. 55.Mackie, I. M. 1982. Fish protein hydrolysates. Process Biochem. 17: 26-32. 56.Mackie, I. M. 1982. Fish protein hydrolysates. Process Biochem. 31: 26-31. 57.Meister, A. 1984. New aspects of glutathione biochemistry and transport: selective alteration of glutathione metabolism. Fed. Proc. 43: 3031-3042. 58.Oyaizu, M. 1986. Studies on products of browning reaction: Antioxidative activities of products of browning reaction prepared from glucosamine. Jpn. J. Nutr. 44: 307. 59.Pihlanto, A., Akkanen, S., Korhonen, H. J. 2008. ACE-inhibitory and antioxidant properties of potato (*Solanum tuberosum*). Food Chem. 109: 2744- 2748. 60.Quagila, G. B. and Orban, E. 1987. Enzymic solubilisation of sardine (*Sardina pilchardus*) by comm.ercial protease. J. Sci. Food Argic. 38: 263-269. 61.Ray, G. and Husain, S. A. 2002. Oxidants, antioxidants and carcinogenesis. Indian J. Exp. Biol. 40: 1213-1232. 62.Rebeca, B. D., Pena-Vera, M. T. and Diaz-castaneda, M. 1991. Production of fish protein hydrolysates with bacterial protease, yield and nutritional value. J. Food Sci. 56(2): 309-314. 63.Salah, N., Miller, N. J., Paganga, G., Tijburg, L., Bolwell, G. P., and Rice- Evans, C. 1995. Polyphenolic flavanols as scavengers of aqueous phase radicals and as chain-breaking antioxidants. Arch. Biochem. Biophys. 322:339-346. 64.Shih, F. F. 1992. Modification of food protein by non-enzymatic methods. In: Biochemistry of Food Protein (B. J. F., Hudson ed.), Ch. 7., Elsevier Applied Science Publishers, London, England. 65.Smith, M. A., Perry, G., Richey, P. L., Sayrec, L. M., Anderson, V. E., Beal, M. F. and Kowall, N. 1996. Oxidative damage in Alzheimer ' s. Nature 382: 120-121. 67.Xie,

- Z., Huang, J., Xu, X., Jin, Z. 2008. Antioxidant activity of peptides isolated from alfalfa leaf protein hydrolysate. *Food Chem.* 111: 370-376.
- 68.Yamaguchi, T., Takamura, H., Matoba, T., and Terao, J. 1998. HPLC method for evaluation of the free radical-scavenging activity of foods by using 1, 1- diphenyl-2-picrylhydrazyl. *Biosci. Biotech. Biochem.* 62(6): 1201 – 1204. 69.Yamamoto, N. 1997. Antihypertensive peptides derived from food proteins. *Biopolymer* 43: 129-134. 70.Yokoyama, k., Chiba, H. and Yoshikawa, M. 1992. Peptide inhibitors for ACE from thermolysin digest of dried bonito. *Biosci. Biotech. Biochem.* 56: 1541-154.